



SCHUTZ DER ORCHIDEEN

Ein ORCHIDEEN-MONITORING (Österreichischen Orchideenschutz Netzwerk) findet seit dem Jahr 2006 an drei ausgewählten Standorten in Micheldorf statt.

1. Ein Stück Kalkmagerrasen in einer Bergwiese des „Geschützten Landschaftsteiles Himmelreich“ mit einer Fläche von ca. 2000m² .
2. Ein Wiesenstück im Landschaftsschutzgebiet Alpernstein.
3. Eine artenreiche Wiese in den Rinnerbergen ist die dritte Wiese, auf der das Orchideen-Monitoring stattfindet.

DERZEIT SIND FOLGENDE ORCHIDEENARTEN IN DER MARKTGEMEINDE MICHELDORF ZU FINDEN:

1. Breitblättrige-Fingerwurz
(*Dactylorhiza majalis*),
ehemals
Breitblatt-Fingerknabenkraut
oder Breitblättriges Knabenkraut



2. Gefleckte Fingerwurz
(*Dactylorhiza maculata*),
früher Geflecktes Knabenkraut



3. Prächtiges Manns-Knabenkraut
(*Orchis mascula* ssp. *speciosa*),
ehemals Stattliches
oder Prächtiges Knabenkraut



4.. Lappland-Fingerknabenkraut
(*Dactylorhiza lapponica*)



5. Großes Zweiblatt
(*Listera ovata*)



6. Weiße Waldhyazinthen
(*Platanthera bifolia*)



7. Grünliche Waldhyazinthe
(*Platanthera chlorantha*)
kommt nur zeitweise vor



8. Kleine Hundswurz
(*Anacamptis morio*),
früher Kleines Knabenkraut
(*Orchis morio*)



9. Kamm-Hundswurz
(*Anacamptis pyramidalis*),
früher Pyramiden-Stendel,
Spitz-Orchis, Hundswurz



10. Helm-Knabenkraut
(*Orchis militaris*)



11. Gewöhnliche
Mücken-Händelwurz
(*Gymnadenia conopsea*)



12. Duft- Händelwurz
(*Gymnadenia odoratissima*)



13. Grüne Stendelwurz
(*Epipactis helleborine*),
ehemals Breitblatt-Stendelwurz



14. Rote Stendelwurz
(*Epipactis atrorubens*),
ehemals
Braunrote Stendelwurz



15. Violette Stendelwurz
(*Epipactis pupurata*)



16. Violette Stendelwurz
(*Epipactis pupurata* var. *roseas*)



17. Sumpf-Stendelwurz
(*Epipactis palustris*)



18. Schmalblättriges Waldvöglein
(*Cephalanthera longifolia*),
ehemals
Langblättriges Waldvöglein



19. Breitblättriges Waldvögelein
(*Cephalanthera damasonium*),
ehemals Bleiches oder Creme-
weißes Waldvögelein



20. Rotes Waldvögelein
(*Cephalanthera rubra*)



21. Kugelstendel
(*Traunsteinera globosa*),
ehemals Kugelorchis



22. Höswurz
(*Pseudorchis alba*)



23. Herbst-Wendelorchis
(*Spirantis spiralis*),
früher Herbsdrehähre



24. Netzblatt
(*Goodyera repens*)



25. Fliegen-Ragwurz
(*Ophrys insectifera*),
wird bei uns auch
Bergmandl genannt.



26. Brand-Keuschstängel
(*Neottia ustulata*),
ehemals Brand-Knabenkraut
(*Orchis ustulata*)



27. Vogel-Nestwurz
(*Neottia nidus-avis*)



28. Bleiches Knabenkraut
(*Orchis pallens*)



29. Kißlings Knabenkraut
(*Orchis x kisslingii* G. BECK) ist
ein natürliches Kreuzungspro-
dukt zwischen Bleichem Kna-
benkraut (*Orchis pallens* L.) und
Prächtigem Knabenkraut (*Or-
chis signifera* VEST)



30. Hybriden von Breitblättrige-
Fingerwurz (*Dactylorhiza maja-
lis*) und Gefleckter Fingerwurz
(*Dactylorhiza maculata*)



Fotos: W. Bejvl
A. Pürstinger

Unser Ziel: 2010 und 2011 die Orchideenarten und ihre Standorte zu überprüfen, die Erhaltung von diesen zu sichern und die Daten zu aktualisieren.